AVERTISSEMENTS AGRICOLES DLP 15-3-67 624255

BULLETIN **TECHNIQUE** DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

Tel. 88-30-34

EDITION DE LA STATION DU VAL DE LOIRE ANGERS

88-06-15

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, THORE TOURE VENDEE, DEUX-SEVRES, VIENNE) Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. Cité Administrative, rue Du petil-The

BULLETIN Nº 78 DE MARS 1967 - TOUS DEPARTEMENTS

P. 10

DELAIS d'EMPLOI DES FESTICIDES AVANT LA RECOLTE, DE PRODUITS VEGETAUX DESTINES A l'ALIMENTATION (suite)

Nom commun du produit :	Délais d'in- terdiction en jours	· ^h
C - Insecticides systémiques:	anni di alimani	of ab atmomatraph and model
Déméton méthyle I Déméton méthyle I Oxydéméton méthyle Endothion Phosphamidon Dimefox Diméthoate Formothion Vamidothion Mévinphos Disulfoton	21 21 21 21 21 60 7 7 7 30 7	Interdit sur cultures légumières Interdit sur cultures légumières Interdit sur cultures légumières Interdit sur cultures légumières Interdit sauf sur houblon Délai de 15 jours sur cultures légumières Interdit sur cultures légumières Interdit sur cultures légumières Interdit sur cultures légumières
Disulfoton D - Insecticides spécifiques		:Interdit pour toutes les cultures sauf :pour les semis ou plantations de bette- :raveset de pommes de terre.
Chlorobenzilate Chloropropylate Binapacryl Chlorfénizon ou P.C.P.P.C.B.S. Fénizon ou P.C.P.B.S. Isolan Dicofol Chlorbenside		inon dangereux pour les abeilles
Tétradifon Thioquinox Tétrasul E - Produits divers Carbaryl	7	non dangereux pour les abeilles
Nicotine Minacide Fongicides Dichlofluanide	10 15 7 21	

AVERTISSEMENTS

TAVELURE DU POIRIER

Dans les départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée, Vienne, et Deux-Sèvres (sauf la région de la Gâtine), les projections d'ascospores sont en augmentation. Par conséquent, il est rappelé qu'un premier traitement doit être effectué au fur et à mesure que les variétés atteignent un stade sensible (stade C3 D correspondant à la séparation des écailles des bourgeons et à l'apparition du sommet des boutons floraux). Dans les vergers déjà traités conformément à la note du 28 février, il est inutile d'effectuer une nouvelle application.

Dans la région de la Gâtine dans les Deux-Sèvres, effectuer un premier traitement au fur et à mesure que les variétés atteindront le stade C3 D.

Dans les régions Sud des départements de la Sarthe et de la Mayenne (sud de Laval et du Mans), les premières projections sont imminentes. Le premier traitement peut donc être envisagé sur toutes les variétés ayant atteint ou dépassé le stade C3 D, dès réception de cette note.

Dans le Nord de ces départements, attendre de prochaines informations pour intervenir.

TAVELURE DU POMPHER -

Dans les départements de Loire-Atlatnique, Maine-et-Loire, Vendée, Vienne et Deux-Sèvres (sauf la région de la Gâtine), les projections d'ascospores sont commencées. Par conséquent, sur toutes les variétés ayant atteint ou dépassé le stade C3 D, effectuer un premier traitement. Pour les variétés plus tardives, attendre que ce stade soit arrivé pour intervenir.

Dans les départements de la Sarthe, de la Mayenne et dans la région de la Gâtine dans les Deux-Sèvres, attendre de prochaines informations de la Station.

INFORMATIONS

OIDIUM DU POMMIER - Les premières conidies sont formées dans les bourgeons des variétés sensibles. Sur ces variétés, profiter du traitement conseillé contre la tavelure pour assurer la protection contre l'oïdium.

<u>PUC RONS</u> - Des fondatrices de différentes espèces de pucerons sont écloses sur pommiers et sur poiriers. En conséquence ajouter un produit aphicide à la bouillie anti-tavelure.

CHANCRE COMMUN DU POMMIER - ANTHONOME - PUCERONS - Dans la région de la Gâtine dans les Deux-Sèvres, effectuer dès maintenant un traitement contre ces différents parasites.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux :

J. DINJERAS.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles :

R. GEOFFRION - J. BOUCHET.

TIRAGE DU 7 HARS 1967 - 2.930 EXEMPLAIRES.